$K(1460)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Observed in $K\pi\pi$ partial-wave analysis.

$K(1460)$ MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
~ 1460	DAUM	81C	CNTR	–	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$
~ 1400	[1] BRANDENB...	76B	ASPK	$\pm$	13 $K^\pm p \to K^+ 2\pi p$

[1] Coupled mainly to $K f_0(1370)$. Decay into $K^*(892)\pi$ seen.

$K(1460)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •					
~ 260	DAUM	81C	CNTR	–	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$
~ 250	[2] BRANDENB...	76B	ASPK	$\pm$	13 $K^\pm p \to K^+ 2\pi p$

[2] Coupled mainly to $K f_0(1370)$. Decay into $K^*(892)\pi$ seen.

$K(1460)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$K^*(892)\pi$	seen
Γ_2	$K\rho$	seen
Γ_3	$K_0^*(1430)\pi$	seen

$K(1460)$ PARTIAL WIDTHS

$\Gamma(K^*(892)\pi)$ Γ_1

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 109	DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$

$\Gamma(K\rho)$ Γ_2

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 34	DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$

$\Gamma(K_0^*(1430)\pi)$ Γ_3

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 117	DAUM	81C	CNTR	63 $K^- p \to K^- 2\pi p$

K(1460) REFERENCES

DAUM	81C	NP B187 1	C. Daum *et al.*	(AMST, CERN, CRAC, MPIM+)
BRANDENB...	76B	PRL 36 1239	G.W. Brandenburg *et al.*	(SLAC) JP

OTHER RELATED PAPERS

ABLIKIM	05Q	PR D72 092002	M. Ablikim *et al.*	(BES Collab.)
TANIMOTO	82	PL 116B 198	M. Tanimoto	(BIEL)
VERGEEST	79	NP B158 265	J.S.M. Vergeest *et al.*	(NIJM, AMST, CERN+)