$K_0^*(1950)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(0^+)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in partial-wave analysis of the $K^-\pi^+$ system. Needs confirmation.

$K_0^*(1950)$ MASS

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
1945±10±20	[1] ASTON	88	LASS	0	11 $K^-p \rightarrow K^-\pi^+n$

[1] We take the central value of the two solutions and the larger error given.

$K_0^*(1950)$ WIDTH

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
201±34±79	[2] ASTON	88	LASS	0	11 $K^-p \rightarrow K^-\pi^+n$

[2] We take the central value of the two solutions and the larger error given.

$K_0^*(1950)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$K\pi$	(52±14) %

$K_0^*(1950)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K\pi)/\Gamma_{total}$ Γ_1/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
0.52±0.08±0.12	[3] ASTON	88	LASS	0	11 $K^-p \rightarrow K^-\pi^+n$

[3] We take the central value of the two solutions and the larger error given.

$K_0^*(1950)$ REFERENCES

ASTON 88 NP B296 493 +Awaji, Bienz, Bird+ (SLAC, NAGO, CINC, INUS)