$\phi_3(1850)$

$I^G(J^{PC}) = 0^-(3^{--})$

$\phi_3(1850)$ MASS

VALUE (MeV)	*EVTS*	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
1854± 7 OUR AVERAGE					
1855±10		ASTON	88E	LASS	11 $K^- p \to K^- K^+ \Lambda$, $K^0_S K^\pm \pi^\mp \Lambda$
1870^{+30}_{-20}	430	ARMSTRONG	82	OMEG	18.5 $K^- p \to K^- K^+ \Lambda$
1850±10	123	ALHARRAN	81B	HBC	8.25 $K^- p \to K \overline{K} \Lambda$

$\phi_3(1850)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*EVTS*	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
$\mathbf{87^{+28}_{-23}}$ **OUR AVERAGE** Error includes scale factor of 1.2.					
64±31		ASTON	88E	LASS	11 $K^- p \to K^- K^+ \Lambda$, $K^0_S K^\pm \pi^\mp \Lambda$
160^{+90}_{-50}	430	ARMSTRONG	82	OMEG	18.5 $K^- p \to K^- K^+ \Lambda$
80^{+40}_{-30}	123	ALHARRAN	81B	HBC	8.25 $K^- p \to K \overline{K} \Lambda$

$\phi_3(1850)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$K\overline{K}$	seen
Γ_2	$K\overline{K}^*(892)+$ c.c.	seen

$\phi_3(1850)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K\overline{K}^*(892)+\text{c.c.})/\Gamma(K\overline{K})$ **Γ_2/Γ_1**

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
$\mathbf{0.55^{+0.85}_{-0.45}}$	ASTON	88E	LASS	11 $K^- p \to K^- K^+ \Lambda$, $K^0_S K^\pm \pi^\mp \Lambda$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
0.8 ±0.4	ALHARRAN	81B	HBC	8.25 $K^- p \to K \overline{K} \pi \Lambda$

$\phi_3(1850)$ REFERENCES

ASTON	88E	PL B208 324	+Awaji, Biewz+	(SLAC, NAGO, CINC, INUS) IGJPC
ARMSTRONG	82	PL 110B 77	+Baubillier+	(BARI, BIRM, CERN, MILA, CURIN+) JP
ALHARRAN	81B	PL 101B 357	+Amirzadeh+	(BIRM, CERN, GLAS, MICH, CURIN)

OTHER RELATED PAPERS

CORDIER	82B	PL 110B 335	+Bisello, Bizot, Buon, Delcourt, Fayard+	(LALO)
ASTON	80B	PL 92B 219		(BONN, CERN, EPOL, GLAS, LANC, MCHS+)