$\Delta(2390)$ F_{37}

$I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{7}{2}^+)$ Status: *

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

$\Delta(2390)$ BREIT-WIGNER MASS

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
≈ 2390 OUR ESTIMATE				
2350 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
2425 ± 60	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ BREIT-WIGNER WIDTH

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
300 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
300 ± 80	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ POLE POSITION

REAL PART

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
2350 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

−2×IMAGINARY PART

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
260 ± 100	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ ELASTIC POLE RESIDUE

MODULUS $|r|$

VALUE (MeV)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
12 ± 6	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

PHASE θ

VALUE (°)	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
−90 ± 60	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$\Delta(2390)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$N\pi$
Γ_2	ΣK

$\Delta(2390)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(N\pi)/\Gamma_{total}$ — Γ_1/Γ

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
0.08 ± 0.04	CUTKOSKY	80	IPWA	$\pi N \to \pi N$
0.07 ± 0.04	HOEHLER	79	IPWA	$\pi N \to \pi N$

$(\Gamma_i\Gamma_f)^{1/2}/\Gamma_{total}$ in $N\pi \to \Delta(2390) \to \Sigma K$ — $(\Gamma_1\Gamma_2)^{1/2}/\Gamma$

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	COMMENT
<0.015	CANDLIN	84	DPWA	$\pi^+ p \to \Sigma^+ K^+$

$\Delta(2390)$ REFERENCES

CANDLIN	84	NP B238 477	+Lowe, Peach, Scotland+	(EDIN, RAL, LOWC)
CUTKOSKY	80	Toronto Conf. 19	+Forsyth, Babcock, Kelly, Hendrick	(CMU, LBL) IJP
Also	79	PR D20 2839	Cutkosky, Forsyth, Hendrick, Kelly	(CMU, LBL)
HOEHLER	79	PDAT 12-1	+Kaiser, Koch, Pietarinen	(KARLT) IJP
Also	80	Toronto Conf. 3	Koch	(KARLT) IJP