$K_2^*(1980)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(2^+)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Needs confirmation.

$K_2^*(1980)$ MASS

VALUE (MeV)	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
1973± 8±25		ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
2020±20		TIKHOMIROV	03	SPEC		40.0 $\pi^- C \to K^0_S K^0_S K^0_L X$
1978±40	241± 47	BIRD	89	LASS	–	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^- p$

$K_2^*(1980)$ WIDTH

VALUE (MeV)	EVTS	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
373±33±60		ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
180±70		TIKHOMIROV	03	SPEC		40.0 $\pi^- C \to K^0_S K^0_S K^0_L X$
398±47	241± 47	BIRD	89	LASS	–	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^- p$

$K_2^*(1980)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$K^*(892)\pi$
Γ_2	$K\rho$
Γ_3	$K f_2(1270)$

$K_2^*(1980)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K\rho)/\Gamma(K^*(892)\pi)$ — Γ_2/Γ_1

VALUE	DOCUMENT ID		TECN	CHG	COMMENT
1.49±0.24±0.09	ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$

$\Gamma(K f_2(1270))/\Gamma_{total}$ — Γ_3/Γ

VALUE	DOCUMENT ID	TECN	COMMENT
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •			
possibly seen	TIKHOMIROV 03	SPEC	40.0 $\pi^- C \to K^0_S K^0_S K^0_L X$

$K_2^*(1980)$ REFERENCES

TIKHOMIROV	03	PAN 66 828 Translated from YAF 66 860.	G.D. Tikhomirov *et al.*	
BIRD	89	SLAC-332	P.F. Bird	(SLAC)
ASTON	87	NP B292 693	D. Aston *et al.*	(SLAC, NAGO, CINC, INUS)