$\pi^+\pi^-$	seen	838
$K\overline{K}^*(892)+$ c.c.	seen	479
$\eta\rho$	seen	533
$K\overline{K}$	seen	692
e^+e^-	seen	850

$f_J(1710)$ was $\theta(1690)$

$I^G(J^{PC}) = 0^+(\text{even}\,{+}{+})$

Mass $m = 1709 \pm 5$ MeV
Full width $\Gamma = 140 \pm 12$ MeV

$f_J(1710)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\overline{K}$	seen	697
$\pi\pi$	seen	843

$\phi_3(1850)$

$I^G(J^{PC}) = 0^-(3^{-\,-})$

Mass $m = 1854 \pm 7$ MeV
Full width $\Gamma = 87^{+28}_{-23}$ MeV (S = 1.2)

$\phi_3(1850)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\overline{K}$	seen	785
$K\overline{K}^*(892)+$ c.c.	seen	602

$f_2(2010)$

$I^G(J^{PC}) = 0^+(2^{+\,+})$

Seen by one group only.

Mass $m = 2011^{+60}_{-80}$ MeV
Full width $\Gamma = 202 \pm 60$ MeV

$f_2(2010)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$\phi\phi$	seen	–