Charge conjugation × Parity (CP) or Lepton Family number (LF) violating modes, or $\Delta S = 1$ weak neutral current ($S1$) modes

$\pi^+\pi^-$	CPV		$(2.03\pm0.04)\times10^{-3}$	S=1.2	206
$\pi^0\pi^0$	CPV		$(9.14\pm0.34)\times10^{-4}$	S=1.8	209
$\mu^+\mu^-$	$S1$		$(7.4\pm0.4)\times10^{-9}$		225
$\mu^+\mu^-\gamma$	$S1$		$(2.8\pm2.8)\times10^{-7}$		225
e^+e^-	$S1$		$< 4.1\times10^{-11}$	CL=90%	249
$e^+e^-\gamma$	$S1$		$(9.1\pm0.5)\times10^{-6}$		249
$e^+e^-\gamma\gamma$	$S1$	[bb]	$(6.6\pm3.2)\times10^{-7}$		249
$\pi^+\pi^-e^+e^-$	$S1$		$< 2.5\times10^{-6}$	CL=90%	206
$\mu^+\mu^-e^+e^-$	$S1$		$< 4.9\times10^{-6}$	CL=90%	225
$e^+e^-e^+e^-$	$S1$	[cc]	$(3.9\pm0.7)\times10^{-8}$		249
$\pi^0\mu^+\mu^-$	CP,$S1$	[dd]	$< 5.1\times10^{-9}$	CL=90%	177
$\pi^0e^+e^-$	CP,$S1$	[dd]	$< 4.3\times10^{-9}$	CL=90%	231
$\pi^0\nu\overline{\nu}$	CP,$S1$	[ee]	$< 2.2\times10^{-4}$	CL=90%	231
$e^\pm\mu^\mp$	LF	[q]	$< 3.3\times10^{-11}$	CL=90%	238

$K^*(892)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(1^-)$

$K^*(892)^\pm$ mass $m = 891.59 \pm 0.24$ MeV (S = 1.1)
$K^*(892)^0$ mass $m = 896.10 \pm 0.28$ MeV (S = 1.4)
$K^*(892)^\pm$ full width $\Gamma = 49.8 \pm 0.8$ MeV
$K^*(892)^0$ full width $\Gamma = 50.5 \pm 0.6$ MeV (S = 1.1)

$K^*(892)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	Confidence level	p (MeV/c)
$K\pi$	~ 100 %		291
$K^0\gamma$	$(2.30\pm0.20)\times10^{-3}$		310
$K^\pm\gamma$	$(1.01\pm0.09)\times10^{-3}$		309
$K\pi\pi$	$< 7\times10^{-4}$	95%	224

$K_1(1270)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(1^+)$

Mass $m = 1273 \pm 7$ MeV [k]
Full width $\Gamma = 90 \pm 20$ MeV [k]

$K_1(1270)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\rho$	(42 ± 6) %	76
$K_0^*(1430)\pi$	(28 ± 4) %	–
$K^*(892)\pi$	(16 ± 5) %	301
$K\omega$	(11.0 ± 2.0) %	–
$K f_0(1300)$	(3.0 ± 2.0) %	–