$K\omega$	(2.9±0.8) %		319
$K^+\gamma$	(2.4±0.5) × 10^{-3}		627
$K\eta$	($1.4^{+2.8}_{-0.9}$) × 10^{-3}	S=1.1	492
$K\omega\pi$	< 7.2 × 10^{-4}	CL=95%	110
$K^0\gamma$	< 9 × 10^{-4}	CL=90%	631

$K^*(1680)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(1^-)$

Mass $m = 1714 \pm 20$ MeV (S = 1.1)
Full width $\Gamma = 323 \pm 110$ MeV (S = 4.2)

$K^*(1680)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\pi$	(38.7±2.5) %	779
$K\rho$	($31.4^{+4.7}_{-2.1}$) %	571
$K^*(892)\pi$	($29.9^{+2.2}_{-4.7}$) %	615

$K_2(1770)$ [ff] was $L(1770)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(2^-)$

Mass $m = 1773 \pm 8$ MeV
Full width $\Gamma = 186 \pm 14$ MeV

$K_2(1770)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\pi\pi$		–
$K_2^*(1430)\pi$	dominant	287
$K^*(892)\pi$	seen	653
$Kf_2(1270)$	seen	–
$K\phi$	seen	441
$K\omega$	seen	608

$K_3^*(1780)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(3^-)$

Mass $m = 1770 \pm 10$ MeV (S = 1.7)
Full width $\Gamma = 164 \pm 17$ MeV (S = 1.1)

$K_3^*(1780)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	Scale factor/ Confidence level	p (MeV/c)
$K\rho$	(45 ±4) %	S=1.4	612
$K^*(892)\pi$	(27.3±3.2) %	S=1.5	651