$K\pi$	(19.3±1.0) %		810
$K\eta$	(8.0±1.5) %	S=1.4	715
$K_2^*(1430)\pi$	< 21 %	CL=95%	284

$K_2(1820)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(2^-)$

Mass $m = 1816 \pm 13$ MeV
Full width $\Gamma = 276 \pm 35$ MeV

$K_2(1820)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\phi$	possibly seen	481
$K_2^*(1430)\pi$	seen	325
$K^*(892)\pi$	seen	680
$Kf_2(1270)$	seen	186
$K\omega$	seen	638

$K_4^*(2045)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(4^+)$

Mass $m = 2045 \pm 9$ MeV (S = 1.1)
Full width $\Gamma = 198 \pm 30$ MeV

$K_4^*(2045)$ DECAY MODES	Fraction (Γ_i/Γ)	p (MeV/c)
$K\pi$	(9.9±1.2) %	958
$K^*(892)\pi\pi$	(9 ±5) %	800
$K^*(892)\pi\pi\pi$	(7 ±5) %	764
$\rho K\pi$	(5.7±3.2) %	742
$\omega K\pi$	(5.0±3.0) %	736
$\phi K\pi$	(2.8±1.4) %	591
$\phi K^*(892)$	(1.4±0.7) %	363