Fractions of some of the following modes with resonances have already appeared above as submodes of particular charged-particle modes.

$\overline{K}^*(892)^0$ "e^+" ν_e	[hh]	(4.8 ± 0.4) %		720
$\overline{K}^*(892)^0 e^+ \nu_e$		(4.8 ± 0.5) %		720
$\overline{K}^*(892)^0 \mu^+ \nu_\mu$		(4.5 ± 0.6) %	S=1.1	715
$\rho^0 e^+ \nu_e$		$< 3.7 \times 10^{-3}$	CL=90%	776
$\rho^0 \mu^+ \nu_\mu$		$(2.0 {}^{+1.5}_{-1.3}) \times 10^{-3}$		772
$\phi e^+ \nu_e$		< 2.09 %	CL=90%	657
$\phi \mu^+ \nu_\mu$		< 3.72 %	CL=90%	651
$\eta'(958) \mu^+ \nu_\mu$		$< 9 \times 10^{-3}$	CL=90%	684

Hadronic modes with one or three K's

$\overline{K}^0 \pi^+$		(2.74 ± 0.29) %		862
$K^- \pi^+ \pi^+$	[jj]	(9.1 ± 0.6) %		845
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		(1.5 ± 0.3) %		712
$\overline{K}_0(1430)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}^*(1430)^0 \to K^- \pi^+$)		(2.3 ± 0.3) %		368
$\overline{K}^*(1680)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}^*(1680)^0 \to K^- \pi^+$)		$(2.6 \pm 1.3) \times 10^{-3}$		65
$K^- \pi^+ \pi^+$ nonresonant		(7.3 ± 1.4) %		845
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^0$	[jj]	(9.7 ± 3.0) %	S=1.1	845
$\overline{K}^0 \rho^+$		(6.6 ± 2.5) %		680
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to \overline{K}^0 \pi^0$)		(0.7 ± 0.2) %		712
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^0$ nonresonant		(1.3 ± 1.1) %		845
$K^- \pi^+ \pi^+ \pi^0$	[jj]	(6.4 ± 1.1) %		816
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ total $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		(1.4 ± 0.9) %		423
$\overline{K}_1(1400)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}_1(1400)^0 \to K^- \pi^+ \pi^0$)		(2.2 ± 0.6) %		390
$K^- \rho^+ \pi^+$ total		(3.1 ± 1.1) %		616
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^0$ total $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		(4.5 ± 0.9) %		687
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^0$ 3-body $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		(2.8 ± 0.9) %		687
$K^*(892)^- \pi^+ \pi^+$ 3-body $\times$ B($K^{*-} \to K^- \pi^0$)		(1.4 ± 0.6) %		688
$K^- \pi^+ \pi^+ \pi^0$ nonresonant	[kk]	(1.2 ± 0.6) %		816
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^+ \pi^-$	[jj]	(7.0 ± 1.0) %		814
$\overline{K}^0 a_1(1260)^+$ $\times$ B($a_1(1260)^+ \to \pi^+ \pi^+ \pi^-$)		(4.0 ± 0.8) %		328
$\overline{K}_1(1400)^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}_1(1400)^0 \to \overline{K}^0 \pi^+ \pi^-$)		(2.2 ± 0.6) %		390
$K^*(892)^- \pi^+ \pi^+$ 3-body $\times$ B($K^{*-} \to \overline{K}^0 \pi^-$)		(1.4 ± 0.6) %		688
$\overline{K}^0 \rho^0 \pi^+$ total		(4.2 ± 0.9) %		614
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^+ \pi^-$ nonresonant		$(8 \pm 4) \times 10^{-3}$		814